



VINT Assistance

since 2019

## Лечение миомы

### Программа включает в себя:

- Консультации.
- Анализы.
- Операцию (ЭМА).
- Пребывание в стационаре 3-5 дней.
- Расходные материалы и медикаменты.

Ориентировочная стоимость пакета: от 2000 долларов США.

### Узнать больше

#### Что такое миома матки?

Миома матки представляет собой доброкачественное образование, которое находится в матке или на стенке матки. Миомы матки также называют фибромами, фибромиомами или лейомиомами. Миомы состоят из гладкой мышечной и мягкой ткани. Миомы могут быть разного размера: и размером с горошину, и размером с виноградину.

Миомы могут располагаться как внутри матки, так и на внешней или внутренней стенке матки. Симптомы зависят от места расположения миомы.

#### В зависимости от места расположения миомы делятся на четыре типа:

1. Интрамуральные миомы развиваются внутри стенки матки.

Симптомы: тяжесть в животе, частое мочеиспускание, продолжительные менструации, выделение сгустков крови, обильные кровотечения.

2. Субмукозные миомы располагаются на внутренней поверхности стенки матки, сразу под слизистой оболочкой матки (эндометрием).

Симптомы: сильные кровотечения. Этот тип миом самый редкий.

3. Субсерозные миомы растут на внешней поверхности стенки матки.

Симптомы: боль и тяжесть внизу живота.

4. Педункулярные миомы (миомы на ножках) появляются на внутренней (педункулярные субмукозные) или внешней (педункулярные субсерозные) поверхности стенки матки. Они выступают над поверхностью матки (имеют

ножку), могут смещаться и даже поворачиваться, вызывая ощущение тяжести и боль внизу живота.

### **Наиболее распространенные симптомы:**

- Обильное кровотечение, тошнота и появление сгустков крови во время менструации;
- Продолжительные менструации (более 7-8 дней);
- Вагинальное кровотечение между менструациями;
- Боль и тяжесть внизу живота или в пояснице, вздутие живота;
- Боль во время занятий сексом;
- Проблемы с мочеиспусканием: истечение мочи (недержание) или невозможность опорожнить мочевой пузырь (задержка мочеиспускания);
- Запоры;
- Хронические выделения из влагалища;
- Прибавка в весе;
- Анемия (низкое содержание эритроцитов в крови);
- Бесплодие или проблемы с зачатием.

### **Факторы, повышающие риск развития миом, включают:**

- Наследственность;
- Репродуктивный возраст (от 35 и старше);
- Ожирение;
- Отсутствие предыдущих беременностей;
- Раннее начало менструаций;
- Позднее наступление менопаузы.